

MEDICAMENTOS CONTROLADOS

Nome Químico	Nome Comercial	Classificação
Levodopa	Prolopa	Antiparkinsoniano
Selegilina	Niar	Antiparkinsoniano
Flufenazina	Anatenol	Antipsicótico
Haloperidol	Haldol	Antipsicótico
Pimozida	Orap	Antipsicótico
Amissulprida	Socian	Antipsicótico
Clorpromazina	Amplictil	Antipsicótico
Clozapina	Leponex	Antipsicótico
Levomepromazina	Neozine	Antipsicótico
Olanzapina	Zuprexa	Antipsicótico
Quetiapina	Seroquel	Antipsicótico
Risperidona	Zargus, Risperdal	Antipsicótico
Sulpirida	Dogmatil	Antipsicótico
Trifluoroperazina	Stelazine	Antipsicótico
Carbonato de Lítio	Carbolitium, Priadel	Estabilizante de humor
Ac. Valpróico/Divalproato de sódio	Depakene, Depakote, Valpakene	Anticonvulsivante
Carbamazepina	Tegretol	Anticonvulsivante
Fenitoína	Hidental	Anticonvulsivante
Fenobarbital	Gardenal, Edhanol	Anticonvulsivante
Lamotrigina	Lamictal	Anticonvulsivante
Zolpiden	Stilnox	Hipnótico (indutor de sono)
Alprazolan	Frontal, Apraz, Altrox	Ansiolítico
Bromazepan	Lexotan , Somalium	Ansiolítico
Buspirona	Ansitec, Ansienon, Buspar, Buspanil	Ansiolítico
Clobazan	Frizium	Ansiolítico
Clonazepan	Rivotril, Clonotril, Navotrax	Ansiolítico
Clordiazepóxido	Limbitrol, Psicosedim, Menotensil	Ansiolítico
Clozazolan	Clozal, Elum, Olcadil	Ansiolítico
Diazepam	Valium, Ansilive, Compaz, Dienpax, Noan,	Ansiolítico
Flunitrazepan	Rohypnol	Ansiolítico
Lorazepan	Lorax, Ansilon, Lorenin, Loserdal, Max-pax, Mesmerin, Ativan, Temesta, Tavor	Ansiolítico
Amitriptilina (cloridrato)	Tryptanol, Amitryl	Antidepressivo
Bupropiona	Zyban , Bup	Antidepressivo
Citalopran	Cipramil	Antidepressivo
Clomipramina	Anafranil, Clo	Antidepressivo
Duloxetina	Cymbalta	Antidepressivo
Escitalopran	Cipralex, Lexapro, Exodus	Antidepressivo
Fluoxetina (cloridrato)	Prozac, Verotina, Daforin, Deprax, Lovan, Prozen, Sarafem, Selectus, Symbax, Eufor, Fluxene,	Antidepressivo
Fluvoxamina	Dumyrox, Luvox	Antidepressivo
Imipramina	Tofranil	Antidepressivo
Maprotilina		Antidepressivo
Mirtazapina		Antidepressivo
Moclobemida	Aurorix	Antidepressivo
Nortriptilina (cloridrato)	Nortelor , Pamelor	Antidepressivo
Paroxetina (cloridrato)	Pondera	Antidepressivo
Reboxetina	Edronax, Prolift	Antidepressivo
Sertralina	Zoloft, Sercerin, Novativ, Tolrest, Serenata, Assert	Antidepressivo
Tianeptina	Stablon	Antidepressivo
Tranilcipromina e Trifluoperazina	Stelapar	Antidepressivo
Trazodona	Triticum	Antidepressivo
Venlafaxina	Efexor	Antidepressivo
Metilfenidato	Concerta, Ritalina	Estimulante SNC (Derivado anfetamina)
Sibutramina	Meridia, Reductil, Sibutral, Plenty, Saciette; Biomag , Vazy	Moderador de apetite

LEGENDA

NÃO PODE participar
 Caso clínico NÃO recomendado
Não tomar NO DIA
 Medicação deve ser interrompida dias antes, se o caso permite (Com aval médico)

EXCESSÃO

Tratamento de Desintoxicação

Normalmente é utilizada associação de vários ansiolíticos, antipsicóticos e até anticonvulsivantes.
(Analisar caso, se possível com aval médico)

MEDICAMENTOS NÃO CONTROLADOS

Nome Químico	Nome Comercial	Classificação
Atenolol	Atenolol, Atenol, Angipress	Antihipertensivo
Captopril	Captopril, Capotem	Antihipertensivo
Losartan	Atacand	Antihipertensivo
Maleato de enalapril	Renitec, Eupressim, Vasopril	Antihipertensivo
Metoprolol	Selopress	Antihipertensivo
Propranolol	Inderal	Antihipertensivo
Verapamil	Dilacoron	Antihipertensivo
Glibenclamida	Daonil	Hipoglicemiante
Metformina	Glucoformim, Glifage	Hipoglicemiante
Baclofenaco	Lioresal	Relaxante muscular
Carisoprodol	Tandrilax	Relaxante muscular
Ciclobenzaprina	Miosan	Relaxante muscular
Orfenadrina	Dorflex	Relaxante muscular
Loratadina	Claritin	Antialérgico
Cetirizina	Zyrtec	Antialérgico
Dexclorfeniramina	Celestamine, Polaramine	Antialérgico
Fenoterol+ Ipratropio	Berotec+Atrovent	Brocodilatadores(inalação)
Salbutamol	Aerolin, aeroflux	Brocodilatadores

LEGENDA

Medicação não pode ser interrompida

Não tomar no dia

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

Casos que exigem cautela:

***** Medicação de uso contínuo que não pode ser interrompida *****

- **Diabéticos:** NÃO PODEM ficar longos períodos de tempo sem se alimentar. Como a Ayauasca queima glicose, deve-se oferecer frutas em espaços de tempo regulares (DURANTE O RITUAL);
- **Hipertensos:** Pode haver leve aumento de pressão com a Ayauasca, portanto, a pessoa deve tomar o medicamento normalmente e receber atenção redobrada no ritual, inclusive analisando a dose a ser dada caso a caso, levando-se em consideração se a pressão está controlada, a idade da pessoa, etc. Casos de cardiopatia mais grave, como marcapassos, precisam de liberação do cardiologista para participar do ritual.

Deve-se evitar qualquer outro tipo de medicação em dia de ritual, sempre entre em contato caso tome algum medicamento, mesmo que não seja um psicotrópico (medicação sujeita a controle especial pela Portaria 344/98 - Ministério da Saúde), toda medicação deve ser relatada na ficha de anamnese, para análise da participação.

Fonte:

Portaria 344/98 (Ministério da saúde) - Última atualização link - <http://portal.crfsp.org.br/noticias/3576-portaria-34498.html>
DEF. 0 38 º Edição (JBM - Jornal Brasileiro de Medicina)

Psicosite - <http://www.psicosite.com.br/>

<http://pfarma.com.br/noticia-setor-farmaceutico/legislacao-farmaceutica/733-rdc-35-portaria344-98.html>

Organização:

